

# 7歳半を超えた方の予防接種



予防接種法に基づく定期の予防接種については次の表のとおりですので忘れずに接種しましょう。

◎指定医療機関（裏面参照）で、予防接種を受けてください。（事前に予約が必要です。）

対象疾病 (ワクチン)	接 種						備 考
	対 象 年 齢	標準的な接種年齢	接種量	方法	回数	間 隔	
日本脳炎 2期	9歳の誕生日の前日～13歳の誕生日の前日まで 平成21年10月2日以降に生まれた方	9歳の誕生日の前日～10歳に達するまで	0.5ml	皮下	1回		
日本脳炎 (特例①)	平成7年4月2日～平成19年4月1日に生まれた方	20歳の誕生日の前日までに接種完了	0.5ml	皮下	1回目(1期1回に相当) 2回目(1期2回目に相当)4 3回目(1期追加に相当) 4回目(2期に相当)	1回目から6～28日(緩和規定あります) 2回目から6月以上(概ね1年) 3回目から6日以上(できれば5年)	平成17年度から平成21年度まで接種勧奨を差し控えたことにより、日本脳炎の予防接種を受ける機会を逸した方に対する特例です。
日本脳炎 (特例②)	平成19年4月2日～平成21年10月1日に生まれた方	2期は9歳の誕生日の前日～13歳の誕生日の前日まで。 1期(3回)を7歳半までに接種できなかった場合、1期末接種分を2期接種期間(9歳以上13歳未満)に接種できます。	0.5ml	皮下	1期1回目 1期2回目 1期追加 2期	1回目から6日以上 2回目から6月以上(概ね1年) 1期追加から6日以上(できるだけあける)	平成17年度から平成21年度まで接種勧奨を差し控えたことにより、日本脳炎の予防接種を受ける機会を逸した方に対する特例です。
ジフテリア 破傷風	2種混合 ワクチン	2期 11歳の誕生日の前日～13歳の誕生日の前日まで	0.1ml	皮下	1回		
子宮頸がん予防	2価 ワクチン(サーバリックス)	小6～高1に相当する女子	0.5ml	筋肉内	3回	2回目: 1回目から1月以上の間隔をおく 3回目: 1回目の接種から5月以上、かつ2回目の接種から2月半以上の間隔をおく	標準的な接種 2回目: 1回目の接種から1月 3回目: 1回目の接種から6月
	4価 ワクチン(ガーダシル)					2回目: 1回目の接種から1月以上の間隔をおく 3回目: 2回目の接種から3月以上の間隔をおく	標準的な接種 2回目: 1回目の接種から2月 3回目: 1回目の接種から6月

- ◎ 接種当日は、「母子健康手帳」「予防接種予診票」を忘れずにお持ち下さい。
- ◎ 接種する際は必ず、説明書『予防接種と子どもの健康』をお読み下さい。
- ◎ 予診のみで予防接種ができなかった場合は、母子手帳を持参し、町健康増進課で予診票の再交付を受けてください。
- ◎ 対象年齢は法律に基づき、誕生日の前日で1歳を加算します。  
「～歳未満」とは、その誕生日の前日までですのでご注意ください。