

令和2年10月1日から ロタウイルスワクチンが定期予防接種になります！

これまで任意接種となっていましたロタウイルスワクチン接種は、令和2年10月1日から予防接種法に基づく定期接種になります。

対象者・接種期限

令和2年8月1日以降に生まれた方

ロタリックス：出生6週0日後から出生24週0日後まで

ロタテック：出生6週0日後から出生32週0日後まで

※ただし、9月30日までに接種した回数は任意接種（自己負担あり）となります。

接種回数


どちらかを選択して下さい

ロタリックス(1価)：2回

ロタテック(5価)：3回

経口接種(飲むタイプのワクチン)

接種方法



- ・出生〇週〇日後は、誕生日の翌日を1日目として数えます。
- ・1回目の接種は出生14週6日後までに接種し、2回目以降は27日以上の間隔をあけ、接種期限までに、できるだけ早く接種完了させましょう。(ロタリックス：出生24週0日後まで、ロタテック：出生32週0日後まで)
- ・令和2年8月生まれで、9月30日までに任意接種（自己負担あり）で接種歴のある方は、10月1日以降に接種する分のみが定期接種となりますのでご注意ください。

注 意 点

- ◎令和2年7月以前に生まれた方は定期接種対象外です。ただし、ロタリックスのみ任意予防接種の助成制度があります（1回7000円助成、ロタテックへの助成はありません）。
- ◎腸重積症の既往歴があることが明らかな者、先天性消化管障害を有する者（その治療が完了したものを除く）、重症複合免疫不全症の所見が認められる者は対象外です。
- ◎授乳後は嘔吐する可能性があるため、接種後30分程の間隔をあけてからの授乳をお勧めします。
- ◎接種後30分ほどは医療機関で様子を見てから帰宅してください。接種後2週間程度は便中にウイルスが排出されるため、おむつ交換後などワクチン接種を受けたお子さんと接した際には、手洗いをするなど注意をしてください。接種後（特に1～2週間）は腸重積症（裏面参照）の症状に注意し、症状が見られた際には、すみやかに接種した医療機関を受診してください。

接種の予約・持ち物

持ち物：予診票 母子健康手帳 健康保険証

※必ず町で交付した予診票を使用し接種してください。
予診票は9月末に郵送します。

◎医師からワクチン接種の効果・副反応・予防接種健康被害救済制度について説明を受けましょう。

◎予診を受けて、体調が悪い場合などには、接種できないことがあります。



ロタウイルスワクチンについて


ロタウイルス胃腸炎の重症化を予防します。ロタウイルス胃腸炎は感染力が非常に強く、激しい下痢や嘔吐を起こし、入院や合併症を起こすこともあります。生後すぐに感染する場合もあるので、ワクチンの接種は、早い時期に完了させることが大切です。ロタウイルスワクチンは2種類（ロタリックス、ロタテック）ありますので、医療機関で相談し、どちらかのワクチンを選んでください。

腸重積症について

腸重積症とは、腸管に腸管が入り込み、腸が閉塞状態になることです（下図）。ロタウイルスワクチン接種後1週間程度、腸重積症の発症が、わずかですが上がる可能性が知られています。腸重積症は、ワクチンを接種しなくても生後3～4か月頃から月齢が上がるにつれて多くなる病気ですので、早めにワクチンを接種完了することが大切です。

腸重積症は、時に手術が必要になることもあります。発症後、すぐに治療すれば、ほとんどの場合、手術をせずに治療できます。接種後1～2週間の間に以下のような症状が一つでも見られた場合、すみやかに医療機関を受診してください。他の医療機関を受診する場合には、必ずロタウイルスワクチンを接種したことを医師などに伝えてください。

- 泣いたり不機嫌になったりを繰り返す
- 嘔吐を繰り返す
- ぐったりして顔色が悪くなる
- 血便がでる



ロタウイルスワクチン Q&A

Q ロタリックスとロタテック、有効性には差があるの？

A 接種回数は異なりますが、2種類のワクチンの有効性は同等と考えられています。ロタウイルスによる急性の胃腸炎の重症化予防に効果があるため、どちらのワクチンを接種しても同様の効果があります。

Q 途中でワクチンの種類は変更できるの？

A 特別な事情がない限り、途中で種類の変更はできませんので、最初に接種したワクチンを2回目以降も接種します。

Q 接種後、吐いてしまったらどうしたらいいの？

A 少量でも飲み込みが確認できれば効果が期待できますので、再度の接種は必要ないと考えられます。また、吐いたものがついてしまった場所は、塩素系漂白剤等で消毒し、後始末した後は手をよく洗ってください。

Q 1回目の接種を出生14週6日後までにできなかったらどうするの？

A 月齢が進むと腸重積症にかかりやすくなります。また、接種後約1～2週間は腸重積症のリスクが増すという研究報告もあります。できるだけ腸重積症の起こりにくい時期に接種を受けていただくために、出生14週6日後までに受けることをお勧めしています。出生15週0日後以降に受けることは安全性の観点からお勧めしていません。

R2.8 現在

ロタウイルスワクチン接種指定医療機関（富士北麓管内）



医療機関名	所在地	T E L	医療機関名	所在地	T E L
いしだ女性クリニック	富士吉田市上吉田 2-5-1 Qスタ5F	25-7100	宮下医院（明見）	富士吉田市大明見 6-1-6	22-5687
大田屋クリニック	富士吉田市上吉田 5-8-3	24-0678	吉田医院	富士吉田市中曽根 1-5-10	22-0142
皆春堂 田辺医院	富士吉田市下吉田 2-14-28	22-0140	富士吉田市立病院	富士吉田市東 7-11-1	22-4111
加賀谷医院	富士吉田市上吉田東 4-15-34	23-2450	青木医院	富士河口湖町小立 7205	72-0777
鈴木医院	富士吉田市竜ヶ丘 1-4-8	23-7075	いしはらクリニック	富士河口湖町船津 584-1	72-5666
つゆきこどもクリニック	富士吉田市下吉田 8-18-29	24-8300	かわぐち湖ファミリークリニック	富士河口湖町小立 4115-1	72-2000
内藤医院	富士吉田市下吉田 3-9-13	22-0162	ひろこどもクリニック	富士河口湖町船津 4940-1	28-5633
羽田レディースクリニック	富士吉田市上吉田 6-10-14	30-0311	渡辺医院	富士河口湖町船津 1496	72-2835
富士の森クリニック	富士吉田市上吉田 7-12-14	30-5522	山梨赤十字病院	富士河口湖町船津 6663-1	72-2222
堀内産婦人科医院	富士吉田市下吉田 7-3-14	22-1151	富士高原診療所	富士河口湖町富士ヶ嶺 1219-1	89-2511